2. Rozpoznanie przed porodem: CII PII, 40 Wod

KARTA OBSERWACJI PORODU

1. Znak tożsamości: 96 (rok) 10 (miesiąc) 17 (dzień urodzenia)

3. Nazwisko i imię: Anna Nowak 4. Wiek 26 5. Para 1 0 1 6. Data ostatniej miesiączki 12.10.21 7. Termin porodu 19.07.2022

8. Rozpoczęcie obserwacji (data, godzina) 19.07.2022 g. 10[00] 9. Pierwsze skurcze porodowe (data, godzina) 19.07.22 g. 7[00] 10. Bóle parte (data, godzina) 19.07.22 g. 14[50] 11. Poród (data, godzina) 19.07.22 g. 15[15]

12. Położenie: główkowe [X] miednicowe [ ] poprzeczne [ ] skośne [ ] nieokreślone [ ] 13. Ustawienie: pierwsze [X] drugie [ ] nieokreślone [ ] 14. Ułożenie główki: przygięciowe [X] nieokreślone [ ]

15. Asynklityzm: przedni [ ] tylny [ ] 16. Wysokie proste [ ] 17. Zwrot nieprawidłowy [ ] 18. Niskie: poprzeczne [ ] wierzchołkowe [ ] czołowe [ ] twarzowe [ ] 19. Pęcherz płodowy: pęki [X] przebity [ ] data 19.07.22 g. 9[00]

20. Tydzień ciąży 40

21. Godziny, doby-data	19.07.22 10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00
22. Poród (ile godzin trwa)	3	4	5	6	7	8		
23. Odpłynięcie wód (godziny)	1	2	3	4	5	6		
24. Krwawienie tak (nie)								
25. Tętno rodzącej (na minutę)	85		72		77	84		68
26. Ciśnienie krwi (RR)	120/70		117/68		115/62	125/80		120/75
27. Ciepłota ciała "C"	36,6		36,7		36,6	36,8		36,6

28. Tętno płodu na minutę — KTG

okres	pierwszy	drugi
0. Brak tętna		
1. Prawidłowe	X	X
2. Szybkie		
3. Zwolnione		
4. Wahania małe		
5. Wahania duże		
6. Nieokreślone		

bez wskazań położnicy wpięty od tego miejsca tej skalki wód nie wyciekało

CZD g. 15[15]

mc. 3690g.

łożysko kompletne g. 15[25]

mech. Schultzego

waga 6000g, łożysk. 19×20cm, gr. pępowiny 50cm ⇐ Pod spodem na macie ciśnienie krwi ok. 150mb

29. Smółka

30. Rozwarcie ujścia	2cm			6cm	10cm		
31. Skurcze — częstość na kwadrans	2-3	4-5	4-5	5-6	6		
31. Skurcze — ile sekund trwają	30	40-50	40-50	50-60	50-60		
32. Napięcie macicy — 1) wzmożone						X	
32. Napięcie macicy — 2) średnie			X	X	X		
32. Napięcie macicy — 3) obniżone	X	X					
33. Odczuwanie bólu — 1) znosi dobrze	X	X	X				
33. Odczuwanie bólu — 2) opanowuje się				X	X	X	
33. Odczuwanie bólu — 3) podniecona							
34. Część przodująca — 1) nad wchodem	X						
34. Część przodująca — 2) we wchodzie				X			
34. Część przodująca — 3) w próżni				X		X	

35. Leki podawane: (P) 5 jm Oxytocyna 450 ml 0,9% NaCl g. 14[20] ; Paracetamol 1000 mg (1 tabl.) g. 16[52]

36. Wymiary miednicy:												
	międzykolcowy	25	międzygrzebieniowy	29	międzykrętarzowy	31	sprzężna zewnętrzna	20	37. Wynik posiewu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących grupy B (GBS)	ujemny (-)	38. Wynik badania antygenu HBs	ujemny (-)

39. Obserwował (a): Studentka Monika Zaręba
(imię, nazwisko, tytuł, stanowisko)

40. Kontrolował: Położna mgr Daria Piwowarczyk
(imię, nazwisko, tytuł, stanowisko)

41. Rozpoznanie po porodzie: Partus Quaturus g. 15[15] CZD 1 mc. 3690g. Ruptura perinei I° Episiorraphia

(P) 5 jm Oxytocyna + 50 ml 0,9% NaCl g. 14[20]

perinei

Episiorrhaphia